

MUSEU PAULISTA

NOTAS PRELIMINARES

EDITADAS PELA REDACÇÃO

— DA —


REVISTA DO MUSEU PAULISTA

VOLUME II — FASCICULO III

Publicado em Abril de 1923

OFF. GRAPHICAS
LUIZ CARDOZO FILHO
LARGO DO AROUCHE. 2
SÃO PAULO






SciELO

MUSEU PAULISTA



NOTAS PRELIMINARES



EDITADAS PELA REDACÇÃO

— DA —

REVISTA DO MUSEU PAULISTA



VOLUME II — FASCICULO III

Publicado em Abril de 1923



OFF. GRAPHICAS
LUIZ CARDOZO FILHO
LARGO DO AROUCHE, 2
SÃO PAULO





LONGICORNEOS (COL.) DO BRASIL,
NOVOS OU POUCO CONHECIDOS.

— POR —
JULIUS MELZER. (1)

As espécies que considero novas para a sciencia e cuja descripção aqui
apresento são as seguintes :

Metopocoilus picticornis.

Hamalicherus testaceicornis.

Cosmisoma Taunayi.

METOPOCOILUS PICTICORNIS, N. SP.

Elongatus, nitidus, testaceus, capite rufo, verticis maculis duabus magnis, antennis, - scapo, toto, art. 3 et. 4 fere omnino rufis exceptis, - thoracis vittis duabus dorsalibus, punctoque utrinque medio sublaterali et maculis duabus lateralibus, elytrorum vittis quatuor posticis ad apicem conjunctis, metasterni lateribus, femorum tibiaramque apice tarsisque nigris; caput sparsim punctatum, fronte fortiter excavata, punctato-coriacea et rufo-vilosa, vertice sat fortiter bicarinato, oculis minute granulatis; antennae dimidium elytrorum haud attingentes, 12-articulatae, scapo crasso, sparsim punctulato; art. 3 angulato-dentato, 4 - 11 serratis, art. 12 praecedente dimidio brevior; thorax latitudine vix longior, basi constrictus et transversim sulcatus apicem versus sensim attenuatus, politus, sparsim punctatus, angulis posticis utrinque profunde lunatis; elytra basi thorace latiora, ab humero ad apicem sensim perparum attenuata, apicem singulatim rotundata, angulis, suturalibus spinosis, dorso convexa, sparsim punctatis; prosterni processus postice infer coxas longe projectus; mesosterni processus antice tuberculatus et abrupte declivis; metasternum sparsim punctatum; abdomen apice setis fulvis ciliatum.

(1) Esta publicação editada para fins de firmar a prioridade das determinações será incorporada á REVISTA DO MUSEU PAULISTA.

Long. 37 1/2 mm, lat. 8 3/4 mm.

Hab. Serra da Cantareira perto da capital de São Paulo, 1 ex. ♀ na minha coleção.

HAMATICHERUS TESTACEICORNIS, N. SP.

Rufo-testaceus, subopacus, capite, thorace, scapo, femoribus brunneis, subtiliter griseo pubescens; caput mediocriter fere dense punctatum, inter antennis profunde sulcatum, tuberibus antenniferis intus productis, vertice inter oculos carinato; antennae (♀) apicem elytrorum haud attingentes; scapo punctulato—coriaceo, arcuato, clavato, art. 3—10 spinosis, spinis art. 3 valde recurvis; thorax latitudine brevior, antice posticeque coarctatus, lateraliter tuberculo conico instructus, pronoto sat regulariter plicato; scutellum triangulare, griseo-pubescens; elytra crebre punctulato—coriacea, parum nitida, apice quadrispinosa, spinis sub-aequalibus; prosterni processus apice tuberculatus, mesosterni processus planus.

Long. 31—40 mm, lat. 9—12 mm.

Hab. 2 ♀ de Passa Quatro, Sul de Minas, E. Jaeger leg., 1 ♀ de Agua Suja (Minas Geraes) devo a gentileza do Snr. R. Naschold.

Esta especie deve mostrar certas afinidades com *H. CONSOBRINUS* de Gahan, que não conheço mas, as antenas são mais curtas, o espinho do terceiro articulo antenar so está fortemente recurvado enquanto o do quarto articulo forma quasi um angulo recto com este. A cor alem disto tambem é differente e quer me parecer, que especialmente a das antenas permite, distinguir facilmente esta especie, cujos elytros mostram um lustro mediocre. Infelizmente até hoje não me foi possível de obter o ♂ desta especie.

COSMISOMA TAUNAYI n. sp.


Elongatum, nigrum, infra albo-sericeo pubescens, supra tomento denso aureo-sericeo vestitum, elytris fascia media latissima atro-velutina, antennis articulo quinto scopa magna nigra sexto basi scopa aureo-flava fasciculatis; caput subtiliter punctatum, inter antennis concavum, gula nitida, transversim plicata; antennae corpore longiores, subtus basi laxe fimbriatae, scapo elongato, subclavato, punctulato—coriaceo, art. 3—6 elongatis, carinatis, 7—11 multo brevioribus; thorax latitudine fere duplo longior, basi leniter constrictus et transversim sulcatus, a medio ad apicem sensim attenuatus, prosterno antice transversim plicato; scutellum dense aureo-sericeo tomentosum; elytra basi thorace latiora et recte truncata, in medio laterum subincurvata, mox ante apicem arcuatim angustata, apice ipso acuminato in singulis, dorso plana; femora clavata, media et postica pedunculata, haec apicem abdominis haud superantia; tibiae posticae arcuatae, sparsim hirtae; tarsi postici subelongati, art. 1.º 2.º et 3.º simul sumptis subaequali. Long. 11 1/2 mm.

Hab. 1 ♀ de Ponte Nova, Rio Xingú, Estado de Pará.

São Paulo 21 de Abril de 1923.







SciELO



SciELO